Zigarettenrauchen – gefährlicher als gedacht?

Möglichkeiten der medikamentösen Entwöhnung

Wien, 10. 4. 2013

Brath: fum

Inhalt

- Aktivrauchen: Rücksicht auf sich selbst
- Passivrauchen: Rücksicht auf andere
- Rauchen im Arbeitsprozeß
- Rauchstopp: medikamentöse
Unterstützung
- Was bringt Rauchstopp?

Brath: fum

1.

Aktivrauchen – Rücksicht auf sich selbst

Brath: Adip

a.

Diabetes

Brath: fum

Rauchen → Diabetes

- ☞ Raucher haben ein 3.27 fach erhöhtes Risiko, einen Typ 2 Diabetes zu entwickeln, bes. wenn früh zu Rauchen begonnen wird¹
- ☞ Frauen, Jüngere und familiär vorbelastete besonders gefährdet²

1. Kawakami et al, Am J Epid 1997
2. Sairenchi et al, Am J Epidemiol. 2004 Jul 15;160(2):158-62

Brath: fum

Aktiv- u. Passivrauchen bei jungen Erwachsenen: Glukosetoleranz

Prospektiv aus CARDIA-Studie, n = 4742, Alter zu Inklusion: 18 – 30 a
Inzidenz v. Glukoseintoleranz innerhalb v. 15 a
HR adjustiert auf biolog., Verhaltens- und soziodemograph. Faktoren

Houston TK et al, BMJ, 2006

Brath: fum

PROActive: Hauptrisikofaktoren f. Herz-Kreislauf-erkrankungen

Multivarianzanalyse (Signifikanz $p < 0.05$)

	HR	95% CI	p
Alter (Jahre)	1,05	(1,04, 1,06)	<0,0001
Vorausgehender Apoplex	1,71	(1,40, 2,08)	<0,0001
Aktueller Raucher (vs nie geraucht)	1,70	(1,34, 2,16)	<0,0001
Einmaliger Raucher (vs nie geraucht)	1,19	(1,06, 1,42)	0,0012
Kreatinin $\geq 130 \mu\text{mol/l}$	1,67	(1,20, 2,31)	0,0022
Vorausgehender MI	1,49	(1,26, 1,76)	<0,0001
HbA _{1c} $> 7.5\%$	1,48	(1,24, 1,76)	<0,0001
pAVK	1,35	(1,10, 1,65)	0,0036
Einsatz von Diuretika	1,33	(1,13, 1,57)	0,0007
LDL $> 4 \text{ mmol/l}$ (vs $< 3 \text{ mmol/l}$)	1,33	(1,09, 1,67)	0,0166
LDL 3-4 mmol/l (vs $< 3 \text{ mmol/l}$)	1,22	(1,01, 1,48)	0,0357
Insulinontherapie	1,32	(1,12, 1,55)	0,0008
PCI / Bypass-OP	0,76	(0,63, 0,93)	0,0083
Einsatz von Statinen	0,83	(0,69, 1,00)	0,0452
Pioglitazon - Arm	0,84	(0,72, 0,98)	0,0309

+ 70 %

ca. - 20 %

Brath: fum

b.
Lunge

Brath: fum

Krebstod bei Männern USA, 1930 - 1995

American Cancer Society, 1999 (Rates adjusted to 1970 census population)

Brath: fum

Krebstod bei Frauen USA, 1930 - 1995

American Cancer Society, 1999 (Rates adjusted to 1970 census population)

Brath: fum

Krebstod bei Frauen: Österreich

Statistik Austria, Mortalitätsdaten 2011, abgerufen aus derstandard.at, 12. 6. 2012

Brath: fum

Rauchen → Osteoporose?

Metaanalyse von 68 Studien, 40.753 Probanden

	Frauen	Männer
Wirbelkörperbruch	+ 13 %	+ 32 %
Schenkelhalsbruch	+ 31 %	+ 40 %

Stärkste Effekte bei Männern und Älteren.
Schädigung hängt von Dosis ab (Zahl der Zigaretten, Exraucher)

Passivrauchen und Plötzlicher Kindstod

Metaanalyse aller Studien zu elterlichem Rauchen und Plötzlichen Kindstod bis 1997:

ETS exposure	Pooled OR	(95% CI)
Prenatal maternal smoking		
(unadjusted)	2.8	(2.5–3.1)
(adjusted)	2.1	(1.8–2.4)
Postnatal maternal smoking	1.9	(1.6–2.4)

Anderson, Cook. Thorax 1997;52:1003-9
Brath: fum

Rauchen der Eltern und Blutdruck bei Kindern

Screening v. Risikofaktoren f. Hypertonie bei 4236 Vorschulkindern (Ø 5,7 a), Heidelberg

Rauchende Eltern	in %
Väter	28,5
Mütter	20,7
mindestens ein Elternteil	33,4
Beide	11,9

	Odds Ratio	95% CI	P
Systolic BP >+1 SD score			
BMI	1.26	1.20-1.32	<0.0001
Height	0.98	0.96-0.99	0.02
Birth weight	0.65	0.55-0.76	<0.0001
Parental hypertension	1.58	1.25-2.00	0.0001
Parental smoking	1.21	1.02-1.44	0.02
Diastolic BP >+1 SD score			
BMI	1.20	1.15-1.26	<0.0001
Height	0.95	0.94-0.97	<0.0001
Birth weight	0.85	0.72-0.98	0.03
Parental hypertension	1.45	1.15-1.82	0.002

GD Simonetti et al., Circulation 2011;123:292-298

Brath: fum

Passivrauchen und Lungenkrebs

Metaanalyse von 37 Studien von 1981 - 1997 (33 case-control Studien, 4 Kohortenstudien) mit 4,626 Lungenkarzinomen und 477,924 Kontrollen

Belastung	Pooled OR	(95% CI)
rauchender Gatte	1.2	1.1-1.4
rauchende Gattin	1.3	1.0-1.8

Signifikante Dosis-Wirkungs-Beziehung zwischen tgl. Zigarettenzahl des Partners, Zeitdauer des Passivrauchens und Lungenkarzinom

Hackshaw et al. BMJ 1997; 315:980-8

Brath: fum

Passivrauchen & koronare Herzkrankheit, Cotininspiegel

Relatives Risiko für KHK abhängig vom Cotinin-Spiegel bei Nichtrauchern

Whincup et al., BMJ 2004

Brath: fum

Rauchverbot in Italien & koronare Ereignisse

Rom: Todesfälle und Zuweisungen in Krankenhäusern wg. Myokardinfarkt u. instabiler Angina Pectoris; Vergleich 2000 - 2004 (vor Rauchverbot) vs. nach 2005, Alter: 35 bis 84 a Adjustierung auf Temperatur, Luftverschmutzung, Grippeepidemien, zeitl. Trends (KHK, Rauchen)

Cesaroni G, Forastiere F et al.; Circulation 2008 Feb 11

Brath: fum

Feinstaub

Dieselmotor: 30min, Leerlauf, 760 upm
 Zigaretten: 3 Standardzigaretten verglimmen über 30min
 Garage: 60m³

Invernizzi et al, 2004. Aus: Deutsches Krebsforschungszentrum 2005

Brath: fum

Passivrauchen: globale Daten

Retrospektive Datenanalyse von 192 Ländern

Öberg M, Jaakkola MS, Woodward A, Peruga A, Prüss-Ustün A:
 Worldwide burden of disease from exposure to second-hand smoke: a retrospective analysis
 of data from 192 countries. Lancet. 2011 Jan 8;377(9760):139-46.

Brath: fum

“The Debate is Over”

The Health Consequences of Involuntary Exposure to Tobacco Smoke

Surgeon General
 Richard H. Carmona
 June 27, 2006

www.surgeongeneral.gov/library/secondhandsmoke

Brath: fum

Machu Picchu, 2008

Brath: fum

Südafrika, 12/2006

Brath: fum

Österreichisches Rauchertelefon

Willkommen beim österreichischen Rauchertelefon!

Beratungstelefon: 0810 810 013
Mo bis Fr, 13:00-18:00 Uhr
(max. € 0,10/min)

Homepage & Forum:
www.rauchertelefon.at

Email: info@rauchertelefon.at

Brath: fum

3. Rauchen im Arbeitsprozeß

Brath: Adip

Rel. Wahrscheinlichkeit f. Rauchstopp

European Community Respiratory Health Survey II:
9014 Erwachsene, 14 europ. Länder, mittl. Beobachtungszeit: 8,8 a

Janson et al, Eur Resp J, 2006

Brath: fum

Rauchen u. Krankenstand

14.272 schwedische Arbeiter, 16 – 65 a
Raucher vs. Nieraucher

- + 10,7 Tage / Jahr
- Nach Korr. auf berufl. Risikofaktoren: +9,7 Tage / a
- = 38 % aller Krankenstandstage
- Keine Geschlechtsdifferenz

Lundborg P, Tob Control 2007

Brath: fum

Belastung durch Umweltrauch

The bases at EU level are smaller than 1500 respondents.
Therefore these results should be considered to be only indicative

European Commission; Attitude of Europeans towards tobacco, May 2007

Brath: fum

Sehr geehrte Fr. Kollegin!
Sehr geehrter Hr. Kollege!

Diagnosen: Diab. mell. 2, HbA1C 6,4 %, Blutzucker 202 mg/dl
Hypercholesterinämie
art. Hypertonie
COPD III

Derzeit besteht eine gute glykämische Kontrolle, u.g. antidiabet. Therapie wird weiterhin geraten.

Erhöhte Cholesterinwerte mit Simvastatin nun gut eingestellt.

Blutdruck mit 140/80-85 etwas erhöht, wir geben aus diesem Grund Iterium zur bestehenden antihypertensiven Therapie dazu.

Bei COPD III ist STRIKT auf rauchfrei Umgebungsluft zu achten, Aufenthalt in rauchverschmutzten Räumen sollte vermieden werden.

Allgemein werden reichlich regelmäßig körperliche Aktivität sowie eine Ernährung arm an Zucker und Weißmehlprodukten sowie tierischen Fetten, jedoch reich an Gemüse und Vollkornprodukten empfohlen

RP, * 22. 5. 1945, AB v. 3. 6. 2008

Brath: fum

4. Rauchstopp: medikamentöse Unterstützung

Brath: Adip

Faktoren, die das Aufhören erschweren und Hilfsmaßnahmen

Körperliche Abhängigkeit von Nikotin

Medikamente: Nikotinersatztherapie
Bupropion (Zyban®)
Varenicline (Champix®)

Gewohnheit

Verhaltensänderungen

Psychische Faktoren

Problemlösungsstrategien, Belohnungen,
Antidepressiva

Soziale Faktoren

Partner, Arbeitsplatz

Brath: fum

Nikotin: Neurotransmitter

1. Nikotinersatztherapie

Brath:DM

Nikotinersatztherapie

Inhalator

Kaugummi

Pflaster

Sublingualtablette

Brath: fum

2. Bupropion (Wellbutrin®)

Brath:DM

Zyban®: Abstinenz nach 1 Jahr

Brath: fum

3. Varenicline (Champix®)

Brath:DM

Wirkmechanismus von Nikotin im Gehirn

Nikotin bindet v.a. an spezielle Nervenrezeptoren im Hirnstamm
Dadurch wird Botenstoff Dopamin freigesetzt: Belohnungssystem

Brath: fum

Nikotin ↑ Dopaminfreisetzung

Nikotin aktiviert $\alpha 4\beta 2$ Nikotinrezeptor in VTA →
Dopamin ↑ in Nucl. accumbens →
schnelle Belohnung/Satisfaction

Adaptiert nach Picciotto MR et al. Nicotine and Tob Res. 1999; Suppl 2:S121-S125.

Brath: fum

Varenicline

Die Wirkung von CHAMPIC: der duale Wirkmechanismus, der am nikotinergen $\alpha 4\beta 2$ Rezeptor ansetzt¹⁵

Brath: fum

Vareniclin: Übelkeit

- ☞ häufigstes unerwünschte Ereignis (UE)¹⁻³
 - bei fast 30% aller behandelten Raucher¹
- ☞ zumeist als leicht oder mäßig beschrieben^{1,2}
- ☞ Einsetzen zumeist bei Behandlungsbeginn^{1,2}
 - ging im Allgemeinen mit der Zeit zurück
- ☞ bedingte bei <3% der Raucher Abbruch der Therapie^{1,2}

1. Champix Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels. Pfizer Ltd. Sandwich, UK. 2006.
2. Chantix Package Insert. Pfizer Inc. New York, NY, USA, 2006.
3. Tonstad S, et al. AHA. 2006.

Brath: fum

Champix®, Rauchstopp

Brath: Adip

- Therapiedauer 12 Wochen (+ 12 bei Bedarf)
- Titrierung und 2x tägliche Gabe minimiert therapiebedingte Übelkeit
- Einnahme unabhängig von Mahlzeiten

Tag 1-3	0,5 mg 1x tgl
Tag 4-7	0,5 mg 2x tgl
Tag 8-14	1,0 mg 2x tgl
Tag 15+	1,0 mg 2x tgl

Aufhörtermin
für das
Rauchen

Brath: fum

Varenicline: wie lange nehmen?

Aufrechterhaltung d. Abstinenz bei Pat., die nach 12 Wo. Champix rauchfrei waren; CO-gesicherte Abstinenzraten

Tonstad S et al. JAMA 2006;296:64-71

www.rauchfreidurchstarten.at

Brath: fum

www.aerzteinitiative.at

Brath: fum

5. Was bringt Rauchstopp?

Brath: Adip

Rauchstopp ↑ Leben bei Herzkrankheit

Hospitalisierte Raucher mit KHK: randomisiert zu intensiv. Beratung + Pharmakother. od. zu Beratung + Infobrosch.

Mohiuddin et al. Chest. 2007;131:446-452

Brath: fum

Lungenfunktion und Rauchen

Fletcher & Peto

Brath: fum

Rauchstopp verlängert Leben bei COPD

Lung Health Study:
Raucher mit früher COPD: randomisiert zu intensiver Rauchstopp-Intervention vs. Standardtherapie

Anthonisen et al. Ann Int Med. 2005;142:233-239

Brath: fum

Lungenkrebs: 5-Jahresüberleben

adjustiert auf 65 a

Rauchstopp ↑ Überlebensraten im Frühstadium um mehr als das Doppelte

Parsons A et al.: BMJ. 2010 Jan 21;340:b5569

Brath: fum

**„100 Euro investiert –
1500 Euro gewonnen“**

**....und vermutlich viele
Lebensjahre ohne Spätschäden.....**

E.N., *2.7.47; 2/2006

Brath: fum